NOVARTIS

医療関係者各位

放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤

プルヴィクト®静注

PLUVICTO® Injection

放射性医薬品基準 ルテチウムビピボチドテトラキセタン(177Lu)注射液

劇薬 | 処方箋医薬品 注意ー医師等の処方箋により使用すること | 薬価基準収載

「効能又は効果」「用法及び用量」変更のご案内

謹啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤プルヴィクト®静注［一般名：ルテチウムビピボチドテトラキセタン(177Lu)］は「PSMA陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌」を効能又は効果として、2025年9月に承認されましたが、この度、前立腺特異的膜抗原（PSMA）陽性の遠隔転移を有する去勢感受性前立腺癌を含む「PSMA陽性の遠隔転移を有する前立腺癌」への効能又は効果の変更と、用法及び用量の変更が承認されましたので、ご案内申し上げます。PSMA陽性の遠隔転移を有する前立腺癌の患者さんに本剤をお届けすることにより、本領域においてさらに貢献できるよう努めてまいる所存でございます。

今後とも、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

2026年11月吉日

ノバルティス ファーマ株式会社
オンコロジー領域事業部
執行役員　事業部長
張家 銘

効能又は効果
PSMA陽性の遠隔転移を有する前立腺癌

用法及び用量
通常、成人にはルテチウムビピボチドテトラキセタン(177Lu)として1回7.4GBqを6週間間隔で最大6回静脈内投与する。去勢感受性前立腺癌に対しては、アビラテロン酢酸エステル、エンザルタミド、アパルタミド又はダロルタミドと併用すること。なお、患者の状態により適宜減量する。

製造販売(輸入)
ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1　〒105-6333

(文献請求先及び問い合わせ先)
ノバルティス ダイレクト
TEL:0120-003-293
販売情報提供活動に関するご意見
TEL:0120-907-026
受付時間:月～金 9:00～17:30 (祝日及び当社休日を除く)

PLU00013AA0001
2026年11月作成